

Tabela 1 – Prevalência de infecção por *Neisseria gonorrhoeae* em diversas subpopulações no Brasil, 2002-2012

Autor, ano de publicação	Local	População	Amostra	Prevalência (%)
Codes et al., 2002	Salvador, Bahia	Usuários de clínica de planejamento familiar	202	0,5
Martins et al., 2004	Fortaleza e Aracati, Ceará	Gestantes	3303	1,3
		Mulheres em escola secundária	129	0,8
		Homens em escola secundária	96	1,0
Codes et al., 2006	Salvador, Bahia	Mulheres moradoras de favela	155	3,2
		Homens moradores de favela	44	2,2
		Gestantes	3303	1,5
Jalil et al., 2008	Manaus, Fortaleza, Goiânia, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre	Homens trabalhadores de indústria	2814	0,9
		Homens que procuraram atendimento em clínicas de IST	767	18,4
Fernandes et al., 2009	Campinas, São Paulo	Usuários de clínica de planejamento familiar	230	3,0
Benzaken et al., 2010	Manaus, Amazonas	Mulheres que procuraram atendimento em clínicas de IST	239	7,1
Baldin-Dal Pogetto et al., 2011	Botucatu, São Paulo	Profissionais do sexo	102	0,0
Piazzetta et al., 2011	Curitiba, Paraná	Mulheres recrutadas para estudo com a vacina para HPV	335	1,5
Rodrigues et al., 2011	Belo Horizonte, Minas Gerais	Pacientes de clínica ginecológica	224	4,0
Travassos et al., 2012	Salvador, Bahia	Usuários HIV+ de clínica de planejamento familiar	63	0,0

Fonte: Compilação do DDAHV/SVS/MS baseado em várias referências